NW EDK
EDK-Ost
BKZ

Nordwestschweizerische Erziehungsdirektorenkonferenz
Erziehungsdirektoren-Konferenz der Ostschweizer Kantone und des Fürstentums Liechtenstein
Bildungsdirektoren-Konferenz Zentralschweiz

Em cooperação com o Serviço Federal de Saúde Pública

Folheto informativo da Conferência das Direções Gerais das Escolas Elementares na Suiça-alemã (DVK), auxílio para orientação

Como proceder em caso de sintomas de doença e de resfriado nas crianças no Simrdim de Infância e na Escola Primária (1° e 2° ciclo)

Advertência e recomendações para os pais

Quando é que o seu filho deve ficar em casa?
Caso apresente pelo menos um dos seguintes sintomas.
Sintomas de uma doença crónica conhecida não são relevantes na avaliação.

Ligeiro resfriado com nariz pingando **e/ou** dor de garganta com/sem tosse ligeira, sem febre

Além disso seu filho está bem

Febre

Tosse forte
Se não for causada por doença crónica, por ex. asma

Febre
acima de 38.5 graus

Apesar disso seu filho está bem

Seu filho não está bem

Sim

Seu filho fica em casa
Avisar a professora / o professor da turma!

Não

Seu filho queixa-se de algo mais na saúde?
- Queixas gastrointestinais
- Dores de cabeça
- Dores no corpo
- Perda do sentido do paladar e do olfato

Sim

Há uma melhoria significativa no espaço de três dias?

Não

Contacte a médica/o médico do seu filho. A médica/o médico decidirá como proceder, entre outras coisas, se é preciso fazer um teste, ou se a criança pode voltar para a escola.

Sim

Caso seja feito o teste

Entre o teste e a comunicação do resultado, a criança **não pode frequentar a escola!** Informar sem falta o/a professor/a da turma!

O resultado do teste é ...

negativo

Seu filho não tem febre pelo menos durante 24 horas ?

positivo

Outros passos de acordo com as instruções de rastreamento de contactos (Contact Tracing), assistência pela médica / pelo médico da criança. **A criança fica em casa.**

Sim

Após terminar o isolamento

O seu filho pode frequentar a escola

Se uma criança apresentar sintomas que possam indicar COVID-19 e tenha tido contacto próximo com um criança >12 anos sintomática, ou com um adulto sintomático, então essa pessoa deverá ser testada. Caso o teste da pessoa de contacto for positivo, a criança sintomática também deverá ser testada.
Atualização: 25 de setembro de 2020

006139